



1.5章 递归方程的渐进性

递归方程的渐进性

□ 合并排序的复杂性

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & n = 1 \\ 2T(n/2) + O(n) & n > 1 \end{cases}$$



解决方法



□ Substitution方法(代入法):

- 对时间复杂度进行预测, 将预测结果代入递归方程,
如果不产生矛盾, 那么可能是解
- 然后用归纳法证明.

□ Recursion-tree方法(递归树法):

- 把递归方程用树的形式展开
- 然后用估计和的方法来求解.

□ Master方法(主定理法):

- 求解型为 $T(n)=aT(n/b)+f(n)$ 的递归方程

Substitution方法

$$T(n) = 4T(n/2) + O(n)$$



预测时间复杂度为 $O(n^2)$ ，即 $T(n) = c n^2$ ，代入递归方程：

$$\text{左边} = cn^2$$

$$\text{右边} = 4c (n/2)^2 + O(n) = cn^2$$

左右相等，预测成立。

利用归纳法证明。



哈爾濱工程大學

Substitution方法

$$T(n) = 2T(n/2) + n$$

(1) 猜测 n^2 和 n , 均不行, 猜测 $n \log n$

左边 = $c n \log n$

右边 = $2c n/2 \log n/2 = c n (\log n - 1) = c n \log n$

左右相等, 可能是解, 用归纳法证明。

(2) 根据几个已知的计算结果来猜

$$T(2) = 2 T(1) + 2 = 2 = 2 \log 2$$

$$T(4) = 2 T(2) + 4 = 8 = 4 \log 4$$

$$T(8) = 2 T(4) + 8 = 24 = 8 \log 8$$

...

$$T(n) = n \log n$$



Substitution方法

$$T(n) = 2T(n/2) + n$$

假设：猜测是正确的

证明：存在常数 c 和 N ，使得所有 $n \geq N$, $T(n) \leq c(n \log n)$ 。

假设结论对于 $n/2$ 成立。

$$\begin{aligned} T(n) &= 2T(n/2) + n \leq cn \log(n/2) + n \leq cn \log n - cn + n \\ &= cn \log n + (1-c)n \end{aligned}$$

当 $c \geq 1$ 时，得 $T(n) \leq c(n \log n)$.


所以，结论对于 n 成立。

Recursion-tree**方法**

- 以树的形式循环地展开递归方程
- 把递归方程转化为和式
- 然后使用求和技术求解



$$\text{例: } T(n) = n^2 + 3T\left(\frac{n}{4}\right)$$





例: $T(n) = n^2 + 3T\left(\frac{n}{4}\right)$

$$T(n) = n^2 + \frac{3}{16}n^2 + \left(\frac{3}{16}\right)^2 n^2 + \dots + \left(\frac{3}{16}\right)^{\log_4 n - 1} n^2 + \theta(n^{\log_4 3})$$

$$= \sum_{i=0}^{\log_4 n - 1} \left(\frac{3}{16}\right)^i n^2 + \theta(n^{\log_4 3})$$

$$< \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{3}{16}\right)^i n^2 + \theta(n^{\log_4 3})$$

$$= \frac{1}{1 - (3/16)} n^2 + \theta(n^{\log_4 3})$$

$$= \frac{16}{13} n^2 + \theta(n^{\log_4 3}) \quad = O(n^2)$$



Recursion-tree方法

$$T(n) = n^2 + 3T(n/4)$$

证明：假设对于 $n/4$ 有 $T\left(\frac{n}{4}\right) = O\left(\left(\frac{n}{4}\right)^2\right) \leq cn^2/16$

$$T(n) \leq n^2 + \frac{3}{16}cn^2 = cn^2 - \frac{13}{16}cn^2 + n^2$$

当 $c \geq \frac{16}{13}$ 时 $T(n) \leq cn^2$

Master方法



目的：求解 $T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$ 型方程， $a \geq 1, b > 0$ 是常数，
 $f(n)$ 是正函数

方法：记住三种情况，则不用笔纸即可求解上述方程。

Master方法



定理 2.4.1 设 $a \geq 1$ 和 $b > 1$ 是常数, $f(n)$ 是一个函数, $T(n)$ 是定义在非负整数集上的函数 $T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$. $T(n)$ 可以如下求解:

(1). 若 $f(n) = O\left(n^{\log_b a - \varepsilon}\right)$, $\varepsilon > 0$ 是常数, 则 $T(n) = \theta\left(n^{\log_b a}\right)$.

(2) 若 $f(n) = \theta(n^{\log_b a})$, 则 $T(n) = \theta(n^{\log_b a} \log n)$

(3) 若 $f(n) = \Omega\left(n^{\log_b a + \varepsilon}\right)$, $\varepsilon > 0$ 是常数, 且对于某个常数 $c < 1$ 和所有充分大的 n 有 $af\left(\frac{n}{b}\right) \leq cf(n)$, 则

$$T(n) = \theta(f(n))$$



Master方法

*直观地：我们用 $f(n)$ 与 $n^{\log_b a}$ 比较

- (1). 若 $n^{\log_b a}$ 大，则 $T(n) = \theta(n^{\log_b a})$
- (2). 若 $f(n)$ 大，则 $T(n) = \theta(f(n))$
- (3). 若 $f(n)$ 与 $n^{\log_b a}$ 同阶，则 $T(n) = \theta(n^{\log_b a} \lg n) = \theta(f(n) \lg n)$.

更进一步：

(1). 在第一种情况， $f(n)$ 不仅小于 $n^{\log_b a}$ ，必须多项式地小

于，即对于一个常数 $\varepsilon > 0$ ， $f(n) = O\left(\frac{n^{\log_b a}}{n^\varepsilon}\right)$.



$f(n)$ 的上界除以
一个多项式都
是它上界

(2). 在第三种情况， $f(n)$ 不仅大于 $n^{\log_b a}$ ，必须多项式地大

于，即对一个常数 $\varepsilon > 0$ ， $f(n) = \Omega\left(n^{\log_b a} \cdot n^\varepsilon\right)$.

$f(n)$ 的下界除以一
个多项式都是它下
界

Master方法



对于红色部分，Master定理无能为力



例 1. 求解 $T(n) = 9T\left(\frac{n}{3}\right) + n$.

$$a = 9, \quad b = 3, \quad f(n) = n, \quad n^{\log_b a} = \theta(n^2)$$

$$\therefore f(n) = n = O(n^{\log_b a - \varepsilon}), \quad \varepsilon = 1$$

$$\therefore T(n) = \theta(n^{\log_b a}) = \theta(n^2)$$

例 2. 求解 $T(n) = T\left(\frac{2n}{3}\right) + 1$.

$$a = 1, \quad b = 3/2, \quad f(n) = 1, \quad n^{\log_b a} = n^{\log_{3/2} 1} = n^0 = 1$$

$$\therefore f(n) = 1 = \theta(n^{\log_b a})$$

$$\therefore T(n) = \theta(n^{\log_b a} \log n) = \theta(\log n)$$



例3. 求解 $T(n) = 3T(n/4) + n \log n$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = n \log n, \quad n^{\log_b a} = n^{\log_4 3} = O(n^{0.793})$$

$$(1) \quad f(n) = n \log n \geq n^{\log_b a + \varepsilon}, \quad \varepsilon = 0.2$$

$$(2) \text{ 对所有 } n, \quad af(n/b) = 3 \times \frac{n}{4} \log \frac{n}{4} \leq 3 \times \frac{n}{4} \log n = cf(n), \quad c = \frac{3}{4}$$

$$\text{于是, } T(n) = \theta(f(n)) = \theta(n \log n)$$

例4. 求解 $T(n) = 2T(n/2) + n \log n$

$$a = 2, \quad b = 2, \quad f(n) = n \log n, \quad n^{\log_b a} = n$$

$$f(n) = \Omega(n^{\log_b a}) \quad \text{但不存在 } \varepsilon > 0, \text{ 使得 } f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$$

$f(n)$ 大于 $n^{\log_b a}$, 但多项式大于 $n^{\log_b a}$, Master 定理不适用



$$f_1(n) = n \log n \quad f_2(n) = n^{1+\varepsilon}$$

求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \log n}{n^{1+\varepsilon}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n}{n^\varepsilon}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n}{2^{\log n^\varepsilon}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n}{2^{\varepsilon \log n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n}{2^\varepsilon 2^{\log n}} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{m}{2^m} = 0$$

$$\log n \rightarrow n^{\varepsilon>0} \rightarrow (a>1)^n \rightarrow n!$$

$(\log n)^{k>1}$ 和 $n^{\varepsilon>0}$ 比较如何？

